

15.07.2015 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ  
ИНФЕКЦИЙ В КГКОУ СКШИ №3 8 ВИДА.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по профилактике энтеровирусных инфекций**

№	Название мероприятия	Ответственные
1.	Ежедневная система контроля и опроса воспитанников школы интернат № 3 8 вида , включающая:  - опрос о состоянии здоровья каждого воспитанника школы интернат № 3 8 вида, о состоянии здоровья;  - направление учащегося, при наличии у него жалоб, к медицинскому работнику .	Воспитатели , мед.работники.
2.	Обеспечение необходимого питьевого режима	Мед .пункт
3.	Обеспечение проведения дезинфекционного режима и влажных уборок в помещениях школы	Технический персонал
4.	Обеспечение проветривания учебных и жилых помещений	Технический персонал, зав. Кабинетом, мед.работники
5.	Проведение информационных часов с воспитанниками по профилактике ЭВИ.	Медицинские работники
6.	Проведение собраний с работниками КГКОУ СКШИ №3 8 вида, рассмотрением вопроса о профилактике	Зам. директора по ВР, Мед.работники.
7.	Размещение памятки по профилактике энтеровирусных инфекций в уголках безопасности в классных кабинетах .	Зам. директора по ВР Мед.работники.
8.	Ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях	Администрация



Директор КГКОУ СКШИ №3 8 вида: Васильева Н.А.



## **ПАМЯТКА по энтеровирусной инфекции**

**Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, и характеризующаяся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов.**

Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при кипячении.

ЭВИ характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распространением заболевания. Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный.

**Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.**

Источником инфекции являются больные и вирусоносители.

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нерезко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу. Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработке употребляемых фруктов, овощей и последующим



ополаскиванием их кипятком. Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.).

Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.

**Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания.**

При регистрации в случае заболевания простудными инфекциями, необходимо изолировать больного в квартире, выделить отдельную посуду, не допускать до больного детей, ухаживать должен один из членов семьи (в школе интернат мед.работники), при кашле и чихании прикрывать нос одноразовым платочком (использовать однократно), проводить текущую уборку с применением дезинфицирующих средств, проводить регулярное проветривание помещений.